

**TECNICO ECONOMICO**

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali
per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

LICEO ARTISTICO

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design

PROFESSIONALE

Servizi Culturali e dello Spettacolo

Circ. n. 428

Legnago, 12 maggio 2023

Ai genitori degli studenti
Ai docenti

Oggetto: Misure di rinforzo per la sorveglianza dei contatti stretti di scarlattina

La Regione Veneto ha segnalato come, a partire da gennaio 2023, a livello nazionale si sia rilevato un aumento dei casi di scarlattina.

Il Ministero della Salute ha raccomandato alcune misure di rinforzo per la sorveglianza dei contatti stretti, anche in ambito scolastico (compagni di classe e insegnanti), e l'Azienda ULSS 9 – Scaligera ha fornito una informativa, che allego, e ha raccomandato alle Scuole e alle altre Strutture Educative azioni finalizzate ad attuare quanto previsto dalla circolare ministeriale.

Per questo motivo in caso gli studenti contraggano l'infezione è necessario informare la scuola comunicandolo in segreteria didattica.

Il Dirigente scolastico
prof. ssa Luisa Zanettin

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

Informativa ai genitori/personale scolastico in caso di

SCARLATTINA

Cos'è?

La scarlattina è una malattia causata da un batterio (Streptococco di gruppo A). I sintomi sono febbre, mal di gola, faringite e tonsillite e in genere compaiono all'improvviso. Le forme più gravi, se non trattate, possono portare a complicanze severe. Dopo circa 12-48 ore compare il tipico esantema (che svanisce alla pressione), puntiforme, apprezzabile al tatto (tipo carta vetrata).

Modalità di trasmissione:

Per via aerea attraverso goccioline respiratorie di ammalati o portatori.

Periodo di incubazione (cioè il periodo che passa da quando si viene in contatto all'inizio dei sintomi):

2-5 giorni, raramente più lungo.

Periodo di contagiosità (cioè il periodo durante il quale una persona può trasmettere la malattia):

Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, dalla comparsa e per tutta la sua durata. La contagiosità si interrompe dopo 24-48 ore dall'inizio di adeguata terapia antibiotica.

Rischio di diffusione nella scuola:

Medio, in assenza di appropriati interventi.

Azioni preventive:

L'unico sistema per prevenire la diffusione è quello di tenere lontani i soggetti malati dalle persone sane.

COSA FARE IN CASO DI SCARLATTINA

Nei confronti del malato:

Isolamento, con sospensione della frequenza scolastica, almeno fino a 48 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica.

Nei confronti dei conviventi e dei contatti (es. compagni di classe):

Monitorare per 7 giorni l'eventuale comparsa di sintomi ed in tal caso rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale per effettuare un test (tamponi faringei).

NON è indicato effettuare profilassi antibiotiche o test in assenza di sintomi, salvo diversa indicazione del medico.